

Dragi starši!

*Želja nas vseh, tako staršev kot tistih,
ki z otroki oziroma zanje delamo je,
da bi bili naši otroci zdravi
in bi se v vrtcu dobro počutili.
In prav zato
smo pripravili ta priporočila.*



Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana



KDAJ OTROK NE SME V VRTEC?

Starši,

v vrtec pripeljite le zdravega otroka.

Bolan otrok se bo bolje počutil
in hitreje pozdravil
v domačem okolju.

Hkrati bomo preprečili tudi
prenos nalezljive bolezni
na druge otroke v vrtcu.



- ➔ Starši ste tisti, ki najprej prepoznate bolezen pri otroku: vročina, bruhanje, driska, gnojen izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojne oči, uši, gliste ...
- ➔ Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma.
- ➔ Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi (Zakon o nalezljivih boleznih Ur. l. RS, št. 33/06, 4. člen).
- ➔ Ne pripeljite v vrtec otroka, ki je v zadnjih 24 urah bruhal, imel povišano telesno temperaturo, imel drisko (2 ali večkrat dnevno vodeno blato, primesi sluzi, krvi), če v primeru ušivosti ni opravljen prvi postopek razuševanja ...
- ➔ Če je otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni o tem obvestite vrtec.
- ➔ Otroka sme ponovno v vrtec, ko je zdrav in vsaj 2 dni nima vročine, vsaj 1 dan ne bruha in vsaj 1 dan nima več driske.

V skladu s predhodnim dogovorom med vrtcem in starši lahko osebje **ZAVRNE SPREJEM OTROKA V VRTEC** kadar ima otrok katerega od naštetih znakov bolezni:

- ➔ Vročina.
- ➔ Driska (vodeno blato več kot dvakrat dnevno, primesi sluzi ali krvi).
- ➔ Bruhanje - 2 ali večkrat v 24 urah, razen kadar to ni povezano z okužbo.
- ➔ Izpuščaj z ali brez vročine (razen v primeru neinfekcijskih izpuščajev - piki insektov, alergijski izpuščaj ...).
- ➔ Gnojni izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojno vnetje oči, impetigo - gnojno vnetje kože, dokler zdravnik ne potrdi, da ni kužen.
- ➔ Razjede v ustih, razen kadar je izključen infekcijski vzrok bolezni.
- ➔ Uši do naslednjega dne po razuševanju.
- ➔ Garje do 24 ur po zaključenem prvem zdravljenju.

Pri drugih nalezljivih boleznih upoštevamo navodila zdravnika.

- Viri:**
1. Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih.
Dostopno na URL: <http://www.ivz.si>
 2. Vloga vrtca, šole pri preprečevanju in odpravljanju uši.
Dostopno na URL: <http://www.ivz.si>
 3. Navodila za ravnanje ob pojavu garij.
Dostopno na URL: <http://www.ivz.si>